

## Bramley's Seedling



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Kleur</b>                   | Geelgroen/lichtroze blos  |
| <b>Vorm</b>                    | Groot tot zeer groot, breed afgeplat en onregelmatig calvillevormig   |
| <b>Grootte</b>                 | Groot tot zeer groot  |
| <b>Schil</b>                   | Glad, soms bronsrood gestreept aan de zonzijde  |
| <b>Vruchtvlees</b>             | Wit, middelmatig vast een zeer sappig   |
| <b>Vruchtsteel</b>             | Groot tot zeer groot  |
| <b>Kelk</b>                    | Tamelijk breed en middelmatig diep tot diep. Donzig grijze vormen een halfgesloten, middelmatig tot tamelijk grote kelk |
| <b>Boom</b>                    | /   |
| <b>Kweekvormen</b>             | Hoogstam of halfstam en struikvorm  |
| <b>Gezondheid</b>              | Resistent tegen vele ziekten en insecten Vatbaar voor stippigheid   |
| <b>Bloei en vruchtbaarheid</b> | Bloei: middelmatig vroeg<br>Vruchtbaarheid: goed, gedeeltelijkzelfsteriel   |
| <b>Oogst</b>                   | September   |
| <b>Gebruik</b>                 | /   |
| <b>Herkomst</b>                | Engeland (Southwell)  |
| <b>Synoniemen</b>              | Triomphe de Kiel, Crimson Bramley   |